Μαυροειδάκος

Σταύρος, Ιατρός,

Ωτορινολαρυγγολόγος,

Θριάσιο, Ελευσινα,

Ως οξεία ρινοκολπίτιδα ορίζεται η επιμονή των συμπτωμάτων της για περισσότερες από 10 ημέρες, αλλά λιγότερο από 4 εβδομάδες, ενώ στη χρονία ρινοκολπίτιδα τα συμπτώματα επιμένουν για περισσότερο από 8 εβδομάδες **[1].**

Σε περίπτωση που ο ασθενής εμφανιστεί με ρινικά συμπτώματα παραρρινοκολπίτιδας σε συνδυασμό με προσωπαλγία και κεφαλαλγία

Αν

Ο **πόνος** ή **πίεση**

Η **ευαισθησία** προκαλείται στο έσω χείλος του οφθαλμού

Πάνω από τον δακρυϊκό βόθρο.

Ο **πονοκέφαλος** είναι περικογχικός ή κροταφικός

Αν

ο πόνος είναι περικογχικός ή μοιάζει μεοδονταλγία

Η **ευαισθησία** προκαλείται πάνω από το ιγμόρειο κατά την πί

Ο		**πόνος**	□	είναι	αισθητός πάνω	[illegible]

Ο		**πονοκέφαλος**	είναι κροταφικός

Αν

Η		**ευαισθησία**	□	προκαλείται πάνω	από το μετωπιαίο	[illegible]

Ο		**πονοκέφαλος**	□ εντοπίζεται στο	μέτωπο και είναι	σοβαρός

Αν

Ο		**πονοκέφαλος**	□□ περιγράφεται	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Τότε

Η ρινοκολπίτιδα	[illegible]	τις	**ΗΘΜΟΕΙΔΕΙΣ ΚΥΨΕΛΕΣ**

Τότε

Η ρινοκολπίτιδα εντοπίζεται **ΓΝΑΘΙΑΙΟ ή** στο **[illegible]**

Τότε

Η ρινοκολπίτιδα εντοπίζεται **ΜΕΤΩΠΙΑΙΟ** **ΚΟΛΠΟ**

Η οξεία μετωπιαία κολπίτιδα είναι μια επείγουσα ιατρική κατάσταση που ίσως πρέπει να αντιμετωπιστεί χειρουργικά

Τότε

Η ρινοκολπίτιδα εντοπίζεται στο **ΣΦΗΝΟΕΙΔΗ** **ΚΟΛΠΟ**

References

1. Poachanukoon O , Nanthapisal S , Chaumrattanakul U . Pediatric acute and chronic rhinosinusitis: comparison of clinical characteristics and outcome of treatment. Asian Pac J Allergy Immunol.

2012 Jun;30(2):146-51.

2. Kennedy D.W. (ed.) Sinus disease. Guide to first-line management. Health Communications Inc. 1994.