***Celebrex® (****σελεκοξίμπη, celecoxib****)*** *(Searle)*

***Καψάκια, Σκληρά 100mg***

***Σύνθεση: Δραστική ουσία:*** *Celecoxib*

*'Εκδοχα: Lactose monohydrate, sodium lauryl sulphate, povidone K30, croscarmellose sodium και magnesium stearate. Το περίβλημα των καψακίων περιέχει gelatin και titanium dioxide E 171. Το μελάνι περιέχει indigotine E 132.*

***Φαρμακοτεχνική μορφή:*** *Καψάκια, σκληρά για λήψη από το στόμα.*

***Περιεκτικότητα σε δραστική ουσία:***

*Κάθε καψάκιο περιέχει 100 mg celecoxib.*

***Περιγραφή-Συσκευασία:*** *Αδιαφανή, λευκά καψάκια με κυανή λωρίδα με τις ενδείξεις 7767 και 100. Τα καψάκια φέρονται σε κουτιά των 20 τεμαχίων*

***Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία:***

*Αντιφλεγμονώδες και αναλγητικό.*

***Υπεύθυνος κυκλοφορίας:*** *Pharmacia Hellas AE Καλαβρύτων 2, Νέα Κηφισιά 14564 Αθήνα,*

*Τηλ,: 010 819 9000*

***Παρασκευαστής:****Searle & Co, Caguas, Puerto Rico, USA*

***Συσκευαστής:*** *Searle Division of Monsanto plc, UK.*

***Γενικές πληροφορίες:*** *Το CELEBREX είναι ένα αντιφλεγμονώδες φάρμακο, το οποίο ανήκει σε μια κατηγορία φαρμάκων που ονομάζονται εκλεκτικοί αναστολείς της COX-2. Βοηθά στην ανακούφιση του πόνου, του οιδήματος και του πυρετού, που προκαλούνται από την αρθρίτιδα,*

*Το CELEBREX δρα μέσω της μείωσης του επιπέδου των προσταγλανδινών, που παράγονται από τον οργανισμό και οι οποίες προκαλούν πόνο, οίδημα και πυρετό.*

***Ενδείξεις:*** *Συμπτωματική ανακούφιση στη θεραπεία της οστεοαρθρίτιδας ή της ρευματοειδούς αρθρίτιδας.*

***Αντενδείξεις:*** *Εγκυμοσύνη και γυναίκες που βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία εκτός και αν χρησιμοποιούν κάποια αποτελεσματική μέθοδο αντισύλληψης (βλέπε Ειδικές*

*Προφυλάξεις -Γενικά).* ***Θηλασμός.*** *Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε οποιοδήποτε από τα έκδοχα του προϊόντος. Γνωστή υπερευαισθησία στις σουλφοναμίδες. Ενεργό πεπτικό έλκος ή γαστρεντερική αιμορραγία. Φλεγμονώδης νόσος του εντέρου. Βαριά συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια. Σοβαρή ηπατική νόσος. Το φάρμακο αντενδείκνυται επίσης σε ασθενείς που στο*

*παρελθόν εμφάνισαν άσθμα, οξεία ρινίτιδα, ρινικούς πολύποδες, αγγειονευρωτικό οίδημα, κνίδωση ή άλλες αντιδράσεις αλλεργικού τύπου μετά τη λήψη ακετυλοσαλικυλικού οξέος ή μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων (ΜΣΑΦ), καθώς και σε ασθενείς με υπολογισθείσα κάθαρση κρεατινίνης*