



### Βαρούχας Αντώ νιος-Μιχαήλ

Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος [Μηδονόγιο 12, 202 00 Κιάτο Κορινθίας](#)

T.2742020931

Η χρόνια ρινοκολπίτιδα στα παιδιά θεωρείται νόσος, που πρέπει να θεραπεύεται με φάρμακα και συντηρητικές υποστηρικτικές μεθόδους, ενώ σπανίως χρειάζεται η εφαρμογή χειρουργικής θεραπείας. Η αντίληψη ότι μια χρόνια ρινοκολπίτιδα στα παιδιά, η οποία παρά τις επανειλημμένες χορηγήσεις αντιβιοτικών και άλλων φαρμάκων δεν υποχωρεί, πρέπει να αντιμετωπίζεται με τη λειτουργική ενδοσκοπική χειρουργική, δεν είναι ορθή.

Η αντίληψη αυτή στηρίχτηκε στην άποψη ότι η νόσος είναι λοιμώδους αιτιολογίας και ότι η μακρόχρονη θεραπεία με αντιβιοτικά, χωρίς αποτέλεσμα επιβάλλει την ανάγκη της χειρουργικής αντιμετώπισης.

Το γεγονός ότι μια χρόνια ρινοκολπίτιδα επιμένει, παρά τη συντηρητική μακρόχρονη αντιμετώπισή της, τούτο σημαίνει, στις περισσότερες περιπτώσεις, ότι δεν έχει αξιολογηθεί επαρκώς, κλινικά και εργαστηριακά, ο ασθενής.

Συνεπώς οποιαδήποτε θεραπεία κι αν εφαρμόστηκε, αυτή ήταν ή ακατάλληλη ή περιορισμένη, διότι στηρίχτηκε στην άποψη ότι η νόσος ήταν καθαρά λοιμώδους αιτιολογίας.

Επίσης μπορεί να μην αξιολογήθηκε η πιθανή υπερτροφία των αδενοειδών εκβλαστήσεων. Βρέθηκε ότι η αδενοειδεκτομή αποτελεί αποτελεσματική θεραπεία της χρόνιας

ρινοκολπίτιδας στα παιδιά [1].

Η αδενοειδεκτομή αποτελεί επέμβαση πρώτης επιλογής για τη χειρουργική αντιμετώπιση με χρόνια ρινοκολπίτιδα. Η επέμβαση αυτή είναι επιτυχής στο 50% των ασθενών. Εν τω μεταξύ έχει αποδειχτεί ότι η διάταση.

Η διεύρυνση του στομίου εξόδου του ιγμορείου άντρου έχει ήδη αποδειχτεί ως ασφαλής και αποτελεσματική στα παιδιά με χρόνια ρινοκολπίτιδα, στα οποία έχει αποτύχει προηγηθεί αδενοειδεκτομή.

Θα μπορούσε να δοκιμαστεί στα παιδιά με χρόνια ρινοκολπίτιδα η αρχικά η διάνοιξη του στομίου του ιγμορείου με μπαλονάκι καθετήρα [κολποπλαστική με μπαλονάκι, balloonsinuplasty] και επί αποτυχίας να γίνει λειτουργική ενδοσκοπική χειρουργική του ιγμορείου [2].

Η κολποπλαστική με μπαλονάκι αποδείχτηκε ότι είναι θεραπευτικά αποτελεσματική μέθοδος για τη θεραπεία της δυσίατης χρόνιας ρινοκολπίτιδας των παιδιών και ότι είναι σχετικά ασφαλής.

Οι ανατομικές ανωμαλίες των στομών των γναθιαίων άντρων και οι υποπλασίες τους μπορεί να αποτρέπουν την εφαρμογή του καθετηριασμού με μπαλονάκι καθετήρα [3].

### Βιβλιογραφία

1. Wang Y, Wei L. Effect of adenoidectomy on pediatric chronic rhinosinusitis. Lin Chung Er Bi Yan Hou Tou Jing Wai Ke Za Zhi. 2008 Jun;22(11):493-4.

2. [Ramadan HH](#) , [Bueller H](#) , [Hester ST](#) , [Terrell AM](#) . Sinus balloon catheter dilation after adenoidectomy failure for children with chronic rhinosinusitis. [Arch Otolaryngol Head Neck Surg](#). 2012 Jul;138(7):635-7.

3. [Liu J](#) , [Zhao Z](#) , [Chen Y](#) , [Xu B](#) , [Dai J](#) , [Fu Y](#) . Clinical curative effect and safety of balloon sinuplasty in children with chronic rhinosinusitis. [Int J Pediatr Otorhinolaryngol](#). 2017 Sep;100:204-210. doi: 10.1016/j.ijporl.2017.06.026. Epub 2017 Jul 13.