Μαυροειδάκος

Σταύρος, Ιατρός,

Ωτορινολαρυγγολόγος,

Θριάσιο, Ελευσινα,

Ως οξεία ρινοκολπίτιδα ορίζεται η επιμονή των συμπτωμάτων της για περισσότερες από 10 ημέρες, αλλά λιγότερο από 4 εβδομάδες, ενώ στη χρονία ρινοκολπίτιδα τα συμπτώματα επιμένουν για περισσότερο από 8 εβδομάδες **[1].**

Σε περίπτωση που ο ασθενής εμφανιστεί με ρινικά συμπτώματα παραρρινοκολπίτιδας σε συνδυασμό με προσωπαλγία και κεφαλαλγία

Αν

Ο **πόνος** ή **πίεση**

Η **ευαισθησία** προκαλείται στο έσω χείλος του οφθαλμού

Πάνω από τον δακρυϊκό βόθρο.

Ο **πονοκέφαλος** είναι περικογχικός ή κροταφικός

Αν

ο πόνος είναι περικογχικός ή μοιάζει με οδονταλγία

Η **ευαισθησία** προκαλείται πάνω από το ιγμόρειο κατά την πί

Ο **πόνος** είναι αισθητός πάνω [illegible] ζυγώματι

Ο **πονοκέφαλος** είναι κροταφικός

Αν

Η **ευαισθησία** προκαλείται πάνω από το μετωπ[illegible]

Ο **πονοκέφαλος** εντοπίζεται στο μέτωπο και είναι σοβαρός

Αν

Ο **πονοκέφαλος** περιγράφεται ως [illegible]

Τότε

Η ρινοκολπίτιδα [illegible] τις **ΗΘΜΟΕΙΔΕΙΣ ΚΥΨΕΛΕΣ**

Τότε

Η ρινοκολπίτιδα εντοπίζεται στο **ΓΝΑΘΙΑΙΟ ή** **[illegible]**

Τότε

Η ρινοκολπίτιδα εντοπίζεται στο **ΜΕΤΩΠΙΑΙΟ** **ΚΟΛΠΟ**

Η οξεία μετωπική κολπίτιδα είναι μια επείγουσα ιατρική κατάσταση που ίσως πρέπει να αντιμετωπιστεί

χειρουργικά

Τότε

Η ρινοκολπίτιδα εντοπίζεται στο **ΣΦΗΝΟΕΙΔΗ** **ΚΟΛΠΟ**

References

1. Poachanukoon O , Nanthapisal S , Chaumrattanakul U . Pediatric acute and chronic rhinosinusitis: comparison of clinical characteristics and outcome of treatment.
Asian Pac J Allergy Immunol.

2012 Jun;30(2):146-51.

2. Kennedy D.W. (ed.) Sinus disease. Guide to first-line management. Health Communications Inc. 1994.