SERACTIL

1. Ονομασία φαρμακευτικού προϊόντος: SERACTIL 400mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.

2. Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση: Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 400 mg dexibuprofen.

3. Φαρμακοτεχνική μορφή: SERACTIL 400mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Λευκά, επιμήκη, με εγκοπή και στις δύο όψεις, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.

4. Κλινικά στοιχεία: 4.1. Θεραπευτικές **ενδείξεις:** Συμπτωματική αντιμετώπιση για την ανακούφιση του άλγους και της φλεγμονής που σχετίζεται με οστεοαρθρίτιδα. Άμεση συμπτωματική αντιμετώπιση του οξέος άλγους κατά τη διάρκεια της εμμήνου ρύσεως (πρωτοπαθής δυσμηνόρροια). Συμπτωματική θεραπεία άλλων μορφών ήπιας έως μέτριας βαρύτητας άλγους, όπως είναι το μυοσκελετικό άλγος ή το οδοντικό άλγος.

4.2. Δοσολογία και τρόπος χορήγησης: Η δοσολογία πρέπει να προσαρμοσθεί ανάλογα με τη σοβαρότητα της βλάβης και τα συμπτώματα του ασθενούς. Σε χρόνια χορήγηση η δοσολογία πρέπει να προσαρμοσθεί στη χαμηλότερη δόση συντήρησης που εξασφαλίζει κατάλληλο έλεγχο των συμπτωμάτων. Η συνιστώμενη δοσολογία είναι 600 έως 900 mg dexibuprofen ημερησίως διηρημένα μέχρι και σε τρεις εφ' άπαξ δόσεις. Για τη θεραπεία ήπιου έως μέτριου πόνου συνιστώνται αρχικά εφ' άπαξ δόσεις των 200 mg dexibuprofen και ημερήσιες δόσεις των 600 mg dexibuprofen. Η μέγιστη εφ' άπαξ δόση είναι 400 mg

dexibuprofen
. Η δόση μπορεί να αυξηθεί προσωρινά μέχρι 1200
mg
dexibuprofen
ημερησίως σε ασθενείς με οξείες καταστά-σεις ή σε έξαρση. Η μέγιστη ημερήσια δόση είναι 1200
mg
. Για τη δυσμηνόρροια συνιστάται ημερήσια δόση 600 έως 900
mg
dexibuprofen
διηρημένη μέχρι και σε τρεις εφ' άπαξ δόσεις. Η μέγιστη εφ' άπαξ δόση είναι 300
mg
, η μέγιστη ημερήσια δόση είναι 900
mg
.
Η
dexibuprofen
δεν έχει μελετηθεί σε παιδιά και έφηβους (