

Cal/C/ Vita

Cal-C- Vita® (ROCHE)

Βιταμίνες C, D και B6 , ασβέστιο

Σύνθεση:Κάθε αναβράζον δισκίο περιέχει:Βιταμίνη C 1000 mg, ασβέστιο 250 mg (625 mg CaCO₃ , βιταμίνη D (D3 χολοκαλσιφερόλη) 300 IU, βιταμίνη B6 (πυρδοξίνη) 15 mg.

Ιδιότητες: Η χρησιμοποίηση των ενεργειακών και των βασικών ουσιών από τον οργανισμό απαιτεί, εκτός από τις πρωτεΐνες, τους υδατάνθρακες και τα λιπίδια επιπλέον και τη λήψη βιταμινών και ορυκτών αλάτων. Οι μεταβολισμοί της βιταμίνης C, της βιταμίνης D και του ασβεστίου συνδέονται στενά, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τα οστά. Από τα ορυκτά το ασβέστιο έχει τη στενότερη σχέση με το μεταβολισμό των βιταμινών. Το Cal-C-Vita αυξάνει την απόδοση και την αντίσταση του οργανισμού στις ασθένειες.

Φαρμακοκινητική: Καθώς οι δραστικές ουσίες του Cal-C-Vita είναι ισοδύναμες με αυτές που βρίσκονται φυσικά στις τροφές, δεν έχουν γίνει μελέτες φαρμακοκινητικής.

Ενδείξεις: Αυξημένη ανάγκη σε θρεπτικά συστατικά των ιστών κατά την ανάπτυξη την κύηση, το θηλασμό, τη διαδρομή ποικίλων παθήσεων. την ανάρρωση, Το γήρας, τις ιδιαίτερες σωματικές και πνευματικές προσπάθειες, το χειμώνα.

Για την αύξηση της αντίστασης του οργανισμού σε περίπτωση λοιμώξεων.

Σε περιπτώσεις εύκολης κόπωσης, εαρινή κόπωση. Ε

Επικουρική χορήγηση κατά την επούλωση των τραυμάτων και των καταγμάτων.

Προφύλαξη από ης ένδειες βιταμινών και ασβεστίου. Οστεομαλάκυνση διαταραχές του σχηματισμού των οστών και των δοντιών, τερηδόνα των δοντιών.

Για την υποστήριξη του μεταβολισμού και του σχηματισμού των ιστών για τη διέγερση της όρεξης.

Αντενδείξεις: Το Cal-C-Vita δεν πρέπει να χορηγείται σε άτομα που παρουσιάζουν αλλεργία σε κάποιο από τα συστατικά του φαρμάκου Επίσης δεν πρέπει να χορηγείται σε περιπτώσεις υπερβιταμίνωσης D, υπερασβεστιαμίας, νεφρολιθίασης,

ουρολιθίασης ή νεφρικής ανεπάρκειας.

Δοσολογία και τρόπος χορήγησης: 1 αναβράζον δισκίο την ημέρα (ή σύμφωνα με τις υποδείξεις του ιατρού. Διαλυμένο σε ένα ποτήρι νερό, το αναβράζον δισκίο δίνει

ένα ποτό με ευχάριστη γεύση.

Ειδικές προειδοποιήσεις κατά τη χορήγηση

Το Cal-C-Vita δεν πρέπει να χορηγείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε υψηλότερες από τις συνιστώμενες δόσεις.

Ειδικές παρατηρήσεις: Επίδραση στους διαγνωστικούς ελέγχους. Στους διαβητικούς ασθενείς η βιταμίνη C μπορεί να επέμβει στους διαγνωστικούς ελέγχους για τη γλυκόζη των

ούρων, παρ' όλο που δεν επηρεάζει τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα. Επομένως, θα πρέπει να διακόπτεται η χορήγηση της βιταμίνης C αρκετές

ημέρες πριν από την εκτέλεση αυτών των ελέγχων.

Χορήγηση κατά την κύηση και τη γαλουχία:

Η χορήγηση του Cal-C-Vita κατά τη διάρκεια της κύησης μπορεί να ωφέλιμη για την έγκυο. Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι υπάρχει κίνδυνος για πιθανές βλάβες στο έμβρυο. Το Cal-C-Vita μπορεί επίσης να χορηγείται και στις θηλάζουσες μητέρες.

Ανεπιθύμητες ενέργειες:

Το Cal-C-Vita είναι πολύ καλά ανεκτό. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ανεπιθύμητες ενέργειες παρ' όλο που το φάρμακο αυτό έχει χορηγηθεί εκτεταμένα σε μεγάλο αριθμό ατόμων.

Ασυμβατότητες και φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις:

Όταν ακολουθούνται οι συνιστώμενες δασολογικές οδηγίες δεν παρατηρούνται φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις και ασυμβατότητες.

Υπερδοσολογία: Χορήγηση πολύ υψηλών δόσεων και για μεγάλα χρονικά διαστήματα είναι δυνατόν να προκαλέσει υπερβιταμίνωση D ή υπερασβεστιαμία και τα επακόλουθά τους.

Συνθήκες φύλαξης και χρόνος ζωής:

Θα πρέπει να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος μακριά από τα παιδιά. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία λήξης (EXP) που αναγράφεται στο εξωτερικό της συσκευασίας

Συσκευασία: Σωληνάριο 10 αναβραζόντων δισκίων (πορτοκαλί)

(Διάμετρος Περ. 25 mm. Πάχος περ. 7,7 mm. Βάρος περ. 4.600 mg)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ Εργοστ Β΄

Ανθούσα, Αττική.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: ROCHE (HEILAS) ΑΕ

Αλαμάνας 4 & Δελφών, 151 25 Μαρούσι, Αττική